

**RESUMEN DE LAS ENFERMEDADES QUE CONTRAINDICAN LA DONACIÓN**

**ADICCIÓN A DROGAS NO LEGALES:** Por vía parenteral excluye a la donante aunque haya sido sólo una vez. La adicción a otras drogas, incluyendo el alcohol, excluye debido a que la donante puede tener alteradas las facultades para donar un consentimiento pleno.

**ANEMIA:** Padre o madre homocigoto o heterocigoto para hemoglobinopatías o enzimopatías hereditarias.

**ECLAMPSIA SEVERA.**

**COAGULOPATIAS:** Padre a madre con problemas de coagulación hereditarios que requieren tratamiento y que pueden ser transmitidos por las células progenitoras (ejemplo: transtornos plaquetares).

**DEPRESIÓN , PSICOSIS MANÍACO DEPRESIVA NO TRATADA CON REGULARIDAD, DEMENCIA:** No está en situación de donar un consentimiento con plenas facultades.

**HEMOCROMATOSIS, CIRROSIS, ENFERMEDAD DE WILSON.**

**HEPATITIS,** excepto las Hepatitis A, por CMV y por VEB después de 6 meses de la curación. Las parejas sexuales de personas portadoras de hepatitis B o C no podrán donar hasta **4 meses** después del último contacto sexual. Las personas que conviven (contacto doméstico directo), **incluyendo los vacunados**, con portadores del virus de la Hepatitis B no podrán donar hasta **4 meses** de finalizada la convivencia. Las personas que han recibido transfusiones no pueden donar hasta los 4 meses.

**INFERTILIDAD (TRATAMIENTO DE LA):** Si han sido tratadas con gonadotrofinas de origen pituitario antes de 1987.

**ENFERMEDADES AUTOINMUNES:** Artritis reumatoide, enfermedad de Behcet, esclerodermia, esclerosis lateral amiotrófica, esclerosis múltiple y su variedad la enfermedad de Devic, espondiloartropatía, fibromialgia, fiebre reumática, granulomatosis de Wegener, lupus eritematoso sistémico, polimiositis y dermatomiositis, polirradiculoneuropatía desmielinizante inflamatoria crónica, psoriasis extensa en tratamiento con Tigasón o con artritis, púrpura trombocitopénica inmune, sarcoidosis, síndrome de fatiga crónica, síndrome de Guillain-Barré, síndrome de Sjögren, vasculitis sistémica, vitíligo, diabetes tipo I, síndrome de Reiter, vasculopatías.

**ENFERMEDADES DEL SNC:** Enfermedades neurodegenerativas, neurofibromatosis, Parkinson.

**ENFERMEDADES DERMATOLÓGICAS:** Dermatitis herpetiforme, dermatitis bullosa, eritema polimorfe medicamentoso, síndrome de Kaposi, urticaria pigmentosa, micosis fungoide, leucosis cutaneas, enfermedad de Sézary.

**ENFERMEDAD DE CREUTZFELDT-JAKOB:** Se han de excluir las enfermedades sospechosas de ser producidas por virus o priones. Exclusión definitiva de las receptoras de hormonas pituitarias de origen humano (las administradas antes de 1987). Estancia en el Reino Unido: Quedan excluidas las personas que hayan vivido en el Reino Unido más de 12 meses durante el periodo 1980-1996 de forma continuada o intermitente. El Reino Unido está formado por: Inglaterra, Gales, Escocia, Irlanda del Norte, Isla de Man e Islas del Canal. La República de Irlanda (Eire) no forma parte del Reino Unido.

**ENFERMEDADES HEMATOLÓGICAS NEOPLÁSICAS, ENFERMEDADES DE DEPÓSITO Y GENÉTICAS.**

**ENFERMEDADES NEFROLÓGICAS:** Insuficiencia renal crónica.

**ENFERMEDADES ONCOLÓGICAS:** Neoplasias de cualquier tipo excepto el carcinoma *in situ* siempre que no esté recibiendo tratamiento o tenga heridas no curadas.

**ENFERMEDADES PNEUMOLÓGICAS:** Sarcoidosis.

**ENFERMEDADES DEL TIROIDES:** El tratamiento con yodo radioactivo excluye hasta 6 meses después de finalizado. Exclusión si se trata de una neoplasia o forma parte de una enfermedad multisistémica. Fuera de las situaciones anteriores puede aceptarse como donante aunque esté en tratamiento con tiroxina.

**ENFERMEDADES TROPICALES:** Las donantes que vuelvan de un viaje por países tropicales no han de ser aceptadas como donantes hasta transcurridos 6 meses, y siempre que hayan estado libres de enfermedad durante este periodo.

**MIASTENIA/MIOPATÍA.**

**ENFERMEDADES INFECCIOSAS:** Se excluirán durante **5 años** después de la curación, las donantes con antecedentes de **tuberculosis y paludismo**. Se excluirán durante **2 años** después de la curación **Brucelosis (fiebre de Malta), Fiebre Q** (serología negativa), **Fiebre reumática y Osteomielitis**. Después de un episodio de **fiebre >38 °C** las posibles donantes se excluirán durante, por lo menos **2 semanas** a contar desde la fecha de recuperación clínica. **Los antecedentes de** hepatitis C, Hepatitis B, SIDA, Leishmaniosi visceral (Kala-azar), Babesiosis, enfermedad de Chagas, e infección per HTLV-I/II, son causa de exclusión. El antecedente de sarampión, **parotiditis, rubeola y varicela** excluye hasta **4 semanas** de la curación. En caso de **Mononucleosis Infecciosa**, la exclusión será de **6 meses**.