

RESUMEN VACUNACIÓN EN GRUPOS DE RIESGO (NIÑOS Y ADOLESCENTES HASTA 17 AÑOS)*

Orden SAN/178/2023, de 17 de febrero

www.aragon.es/vacunas

GRUPO DE RIESGO / VACUNACIÓN	Hib	Triple vírica	Varicela	Hepatitis B	Hepatitis A	VPH	Enf. meningoc.	Enf. neumoc.	Gripe	Rotavirus	
Immunodepresión (excepto VIH)		Contraindicada	Contraindicada					VNC13 + VNP23 ⁸	Anual		
Infección VIH				HB ³	HA	VPH ⁵	MenACWY				
	CD4 <200/μl	TV si susceptible ¹	VVZ si susceptible ²				MenACWY, MenB ^{6,7}	VNP23 ^{8,9}	Anual		
	CD4 ≥200/μl										
Asplenia, déficit complemento, tto eculizumab	Hib										
Enf. renal crónica avanzada, hemodiálisis						HB ⁴					
Fístula LCR, implante coclear											
Sínd. Down						HB					
Enf. cardiovasculares y respiratorias crónicas ^a											
Enf. hepática crónica ^b						HB	HA				
Diabetes mellitus											
Enf. celiaca											
Enf. neurológicas y neuromusculares											
Hemofilia, trastornos crónicos coagulación ^c						HB					
Hemoglobinopatías y anemias ^d											
Obesidad mórbida											
Antecedente enf. meningocócica invasiva											MenACWY, MenB ⁶
Antecedente enf. neumocócica invasiva ^e							VNC13 + VNP23 ⁸				
Enf. cutánea diseminada grave											
Tto crónico con salicilatos o anticoagulantes											
Prematuridad ^f								Anual	Rotavirus ¹⁰		

* Ver documento/protocolo para más información. Ver tabla 6 para TOS, tabla 8 para TPH y tabla 11 para cáncer.

a) No incluye hipertensión arterial esencial. En asma no complicada solo gripe (VNP23 si tratamiento con corticoides orales). **b)** Incluye infección crónica por Hepatitis B o C. **c)** Incluye trastornos que requieran recepción periódica de transfusiones o hemoderivados. **d)** Si necesitan otros tratamientos -transfusiones periódicas, esplenectomía, corticoides...- revisar recomendaciones específicas. **e)** No incluye la neumonía no bacteriémica. **f)** Menos de 32 semanas de gestación.

¹ De acuerdo calendario oficial: personas no vacunadas con anterioridad. Pauta 2 dosis. ² De acuerdo calendario sistemático: > 12 años si no ha pasado enfermedad ni vacunado previamente o nacidos después 1/01/2015. **O si fibrosis quística y >12 meses.** Pauta 2 dosis. ³ En caso de no respondedor a primera pauta de vacunación, se administrará vacuna tipo adulto (pauta 0,1,6 meses). ⁴ En diálisis y no vacunados, vacuna tipo adulto, si >15 años, vacuna alta carga o adyuvada. Revisión serológica 1-2 meses tras completar pauta y revacunación si fuera necesario.

⁵ Tanto varones como mujeres. 3 dosis. ⁶ MenB: Pauta según edad. ⁷ 1 recuerdo al año -excepto en menores de 24 meses- y recuerdo cada 5 años.

⁹ Si inmunodepresión, fibrosis quística o cirrosis hepática: VNC13 + VNP23.

¹⁰ Lactantes nacidos entre la semana 25 y 32 de gestación, clínicamente estables y sin contraindicación. Pauta según edad y tipo de vacuna.

Vacunación contraindicada	Vacunación no recomendada	Vacunación recomendada	Vacunación según calendario sistemático
------------------------------	------------------------------	---------------------------	--

RESUMEN VACUNACIÓN EN GRUPOS DE RIESGO (POBLACIÓN ADULTA, A PARTIR 18 AÑOS)*

Orden SAN/178/2023, de 17 de febrero

www.aragon.es/vacunas

GRUPO DE RIESGO / VACUNACIÓN	Hib	Triple vírica	Varicela	Herpes zóster	Hepatitis B	Hepatitis A	VPH	Enf. meningoc.	Enf. neumoc.	Gripe	
Inmunodepresión (excepto VIH) ^a		Contraindicada	Contraindicada	HZ/su ¹					VNC13 + VNP23	Anual	
Infección VIH		TV si susceptible	VVZ si susceptible	HZ/su ¹	HB ^{2,3}	HA ⁴	VPH ⁵	MenACWY			
	CD4 <200/μl										
	CD4 ≥200/μl										MenACWY, MenB ^{8,9}
Asplenia, déficit complemento, tto eculizumab	Hib										
Enf. renal crónica avanzada, hemodiálisis							HB ^{2,3}				
Fístula LCR, implante coclear											
Sínd. Down							HB ²				
Enf. cardiovascular y respiratorias crónicas ^b											VNP23 ¹⁰
Enf. hepática crónica ^c , alcoholismo							HB ²	HA ⁴			
Diabetes mellitus											
Enf. celiaca											
Enf. neurológicas y neuromusculares											
Hemofilia, trastornos crónicos coagulación ^d					HB ²						
Hemoglobinopatías y anemias ^e											
Obesidad mórbida											
Tabaquismo											
Lesión intraepitelial cérvix de alto riesgo							VPH ⁶				
Antecedente enf. meningocócica invasiva								MenACWY, MenB ⁸			
Antecedente enf. neumocócica invasiva ^f								VNC13 + VNP23			
Hombres que tienen sexo con hombres					HB ²	HA ⁴	VPH ⁷				

* Ver documento/protocolo para más información. Ver tabla 7 para TOS, tabla 8 para TPH y tabla 12 para cáncer.

a) En HZ solo incluye tto fármacos AntiJAK, TOS -o en espera-, TPH, hematopatías malignas y cáncer órgano sólido en quimioterapia. **b)** No incluye hipertensión art. esencial. En asma no complicada solo gripe (VNP23 si corticoides orales). **c)** Incluye infección crónica por Hep. B o C. **d)** Incluye trastornos que requieran transfusiones o hemoderivados periódicos. **e)** Si ciertos tratamientos - transfusiones periódicas, esplenectomía, corticoides...- ver recomendaciones específicas. **f)** No incluye la neumonía no bacteriémica.

¹ Vacuna de subunidades (HZ/su) dos dosis. ² Realizar marcadores prevacunación (anti-HB, anti-HBs, AgHBs) en personas alto riesgo. ³ Vacuna de alta carga antigénica o adyuvada para no vacunados con anterioridad. Revisión serológica 1-2 meses tras administrar pauta completa y revacunación si fuera necesario. ⁴ Solo si riesgo de infección. Realizar marcadores prevacunación en nacidos antes 1977. ⁵ Hombres y mujeres hasta 26 años, incluidos. ⁶ Sin límite de edad. ⁷ Hasta 26 años.

⁸ MenB: 2 dosis. ⁹ 1 recuerdo al año, recuerdo cada 5 años.

¹⁰ Si inmunodepresión, cirrosis hepática, alcoholismo crónico o fibrosis quística: VNC13 + VNP23.

Vacunación contraindicada	Vacunación no recomendada	Vacunación recomendada	Vacunación según calendario sistemático
--------------------------------------	------------------------------	---------------------------	--